



## Tabla de dosis de Ibuprofeno

*ml=mililitro, tsp=cucharadita*

		DOSIS- De a su hijo/a la dosis indicada cada 6 a 8 horas cuando sea necesario. No exceda más de 4 dosis en 24 horas.			
Peso	Edad	Gotas infantiles- 50 mg (por cada 1.25ml)	Jarabe infantil- 100 mg (por cada 5ml)	Tabletas pediátricas- 100 mg (por tableta)	Tabletas <u>masticables</u> 100 mg (por tableta)
<b>6-11 lbs</b>	0-5 meses	-	-	-	-
<b>12-17 lbs</b>	6-11 meses	1.25 ml	-	-	-
<b>18-23 lbs</b>	12-23 meses	1.875 ml	-	-	-
<b>24-35 lbs</b>	2-3 años	-	5 ml (1 tsp)	-	1 tableta
<b>36-47 lbs</b>	4-5 años	-	7.5 ml (1 ½ tsp)	-	1 ½ tabletas
<b>48-59 lbs</b>	6-8 años	-	10 ml (2 tsp)	2 tabletas	2 tabletas
<b>60-71 lbs</b>	9-10 años	-	12.5 ml (2 ½ tsp)	2 ½ tabletas	2 ½ tabletas
<b>72-95 lbs</b>	11 años	-	15 ml (3 tsp)	3 tabletas	3 tabletas

### Indicaciones Importantes:

- Lea y siga las indicaciones de la etiqueta de cada producto de Ibuprofeno.
- No exceda más de 4 dosis en 24 horas.
- NO administre por más de 10 días al menos que su médico se lo indique.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de administrar Ibuprofeno si su hijo/a está tomando otro medicamento que contenga AINE (antiinflamatorios no esteroideos).
- Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños.
- Si tiene cualquier pregunta por favor consulte a su médico.
- Solamente utilice el dosificador que viene con el producto que está usando. Las cucharas caseras no se deben usar para medir la medicina porque son menos precisas.
- NO administre medicinas de adulto a niños.
- Las gotas infantiles de Ibuprofeno tienen una concentración más alta que el jarabe infantil de Ibuprofeno. Las gotas infantiles han sido diseñadas para ser administradas con el gotero incluido con el medicamento.
- El jarabe infantil de Ibuprofeno tiene una concentración más baja que las gotas infantiles de Ibuprofeno. El jarabe ha sido diseñado para ser administrado con la copita de medir incluida con el medicamento.